

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Efter tre måneder:

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Efter tre måneder:

- Kontrol af compliance

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Efter tre måneder:

- Kontrol af compliance
- Vurdering af eventuelle bivirkninger

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Efter tre måneder:

- Kontrol af compliance
- Vurdering af eventuelle bivirkninger

Ved testosteron-behandling af mænd vurderes talværdi for testosteron og dosis justeres om nødvendigt.

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Efter to år og derefter hvert tredje år:

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Efter to år og derefter hvert tredje år:

- Kontrol af compliance

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Efter to år og derefter hvert tredje år:

- Kontrol af compliance
- Vurdering af eventuelle bivirkninger

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Efter to år og derefter hvert tredje år:

- Kontrol af compliance
- Vurdering af eventuelle bivirkninger
- DXA-scanning
 - *skal om muligt udføres samme undersøgelsessted som første scanning med henblik på at vurdere behandlingseffekt.*

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Ved henvisning til kontrol DXA bør følgende oplyses:

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Ved henvisning til kontrol DXA bør følgende oplyses:

- Om det er kontrol for osteopeni eller osteoporose

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Ved henvisning til kontrol DXA bør følgende oplyses:

- Om det er kontrol for osteopeni eller osteoporose
- Tidspunkt for DXA samt T-score

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Ved henvisning til kontrol DXA bør følgende oplyses:

- Om det er kontrol for osteopeni eller osteoporose
- Tidspunkt for DXA samt T-score
- Husk at det skal være samme scanner

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Ved henvisning til kontrol DXA bør følgende oplyses:

- Om det er kontrol for osteopeni eller osteoporose
- Tidspunkt for DXA samt T-score
- Husk at det skal være samme scanner
- Eventuelt behandling og varigheden af denne

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Ved henvisning til kontrol DXA bør følgende oplyses:

- Om det er kontrol for osteopeni eller osteoporose
- Tidspunkt for DXA samt T-score
- Husk at det skal være samme scanner
- Eventuelt behandling og varigheden af denne
- Der er generelt ikke behov for blodprøvekontrol

Kontrollerne af osteoporosepatienter:

Ved henvisning til kontrol DXA bør følgende oplyses:

- Om det er kontrol for osteopeni eller osteoporose
- Tidspunkt for DXA samt T-score
- Husk at det skal være samme scanner
- Eventuelt behandling og varigheden af denne
- Der er generelt ikke behov for blodprøvekontrol

Ved symptomer på vertebrale frakturer eller signifikant tab af højde skal der udføres røntgen af columna thoracolumbalis med henblik på indikation for anabol behandling.